

**ถ้อยแถลงฉบับที่ 1 จากสถาบันทันตแพทยศาสตร์ผู้สูงอายุ  
(TGGM Geriatric Dentistry Academy) อนุสาขาทันตแพทยศาสตร์  
สมาคมพญาภิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย เรื่องการดูแล  
สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด  
หรือยาต้านเกล็ดเลือด**

Received: 24 May 2023  
Revised: 7 September 2023  
Accepted: 18 September 2023

Statement 1 From Thai Society for Gerontology and Geriatric  
Medicine (TGGM) Geriatric Dentistry Academy; Oral health care  
for older adults who are taking anticoagulants or antiplatelet drugs.

พัชราวรรณ ศรีศิลป์นันท์, ศจี สัตยุดม, กันยารัตน์ คอวนิช, จุฑารัตน์ ฉิมเรือง,  
ทัศนีย์ สลัดยะนันท์, พูลพฤกษ์ ไสภรัตน์, สิริพร สาสกุล, นิรดา ธเนศวร, ปภาวรินทร์ ติระจินดา,  
พิมพ์ชนก พรวนคำ, มัทนา เกษตระทัต, รัชนิวรรณ์ รัตนานูพงษ์, วีรพันธ์ วิชาไทย, ศศิธร บัณฑิตมหากุล,  
อมรรัตน์ ชัยฤทธิ์, ออนอง มั่งคั่ง, เอสเธระ ประทีปทองคำ

Patcharawan Srisilapanan, Sajee Sattayut, Kanyarat Korwanich, Jutharat Chimruang, Thatsanee  
Saladyanan, Poolpruek Soparat, Siriporn Saskul, Nirada Dhanesuan, Paphawarin Terachinda,  
Pimchanok Pkham, Matana Kettratad, Ratchaneewan Ratananupong, Weeranun Vichathai, Sasithorn  
Bunditmahakul, Amornrat Chaiyarit, Onong Mungkung, Esthara Prateptongkum

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่รับประทาน  
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด หรือยาต้านเกล็ดเลือด รวมถึง  
ยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เป็นประเด็นสำคัญ  
เร่งด่วนที่ทันตแพทย์ควรหาข้อสรุปในการดูแลผู้ป่วย  
สูงอายุเป็นอันดับแรก เนื่องจากแม้การปรึกษาแพทย์  
และแพทย์ให้ความเห็นว่า สามารถถอนฟันได้ตามปกติ  
ก็ยังพบปัญหาเลือดออกและหยุดยาก นอกจากนี้  
ผู้ป่วยบางรายยังหยุดยาเองซึ่งเสี่ยงต่อการกำเริบของ  
โรคประจำตัว หรือบางรายหยุดยาภายใต้คำแนะนำของ  
แพทย์ ซึ่งอาจเกิดจากแพทย์คาดว่าเป็นความต้องการ  
ของทันตแพทย์ให้หยุดยาก่อนทำหัตถการทางทันตกรรม  
จึงอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการกำเริบของ  
โรคประจำตัวได้ ฉะนั้น ทันตแพทย์จำเป็นต้องแลกเปลี่ยน  
เรียนรู้กับแพทย์ เพื่อให้ได้แนวทางการติดต่อสื่อสาร  
กับแพทย์และผู้ดูแลผู้ป่วยที่ชัดเจน สำหรับทันตแพทย์  
และทันตบุคลากรจำเป็นต้องมีความรู้ในการประเมิน  
ช่องปากก่อนให้การรักษาทันตกรรม เกี่ยวกับภาวะใด  
หรือหัตถการใดที่มีความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกมากและ  
อาจมีปัญหาในการห้ามเลือด เพื่อให้สามารถวางแผนการ  
รักษาและเตรียมวิธีการห้ามเลือดที่มีประสิทธิภาพ

Oral health care for older adults who are  
taking anticoagulants or antiplatelet drugs, which  
affect blood clotting, is a major concern for dental  
professionals. This issue needs to be understood  
beyond the currently available scientific information.

There has been a practical problem even when  
medical doctors agree to perform oral care. Routine  
tooth extraction still encounters difficulties in stopping  
bleeding.

In addition, some patients prefer to stop taking  
their medications on their own, which carries the risk of  
relapse. The advice of a physician to discontinue  
medication may be decided by assuming that it is  
the needs of dentists. However, it may increase the  
patient's risk.

Dentists should have a good understanding  
of the medical issues that may require consultation with  
a doctor. It is important to communicate directly  
with the medical doctor to clarify the meaning of the  
consultation and ensure that dental treatment can  
be performed. There should be clear guidelines  
for appropriate communication between dentists  
and medical doctors. Before conducting any dental  
treatment, it is essential for dentists and dental  
personnel to assess the oral cavity for risks and  
complications and to have effective methods to  
prevent bleeding. Proper assessment and  
preparation can help in planning a suitable  
treatment.